


Scompenso cardiaco: definizione e manifestazioni cliniche più comuni.
Punteggio massimo 7

Lo scompenso cardiaco o insufficienza cardiaca è una condizione correlata all'incapacità del cuore di pompare quantità di sangue sufficienti per far fronte alle necessità dell'organismo.

I segni e sintomi sono in genere correlati al ventricolo più coinvolto.

Insufficienza cardiaca sinistra:

- ❖ stancabilità e scarsa tolleranza all'attività fisica
- ❖ dispnea anche durante un'attività fisica moderata e a riposo, ortopnea con sonno disturbato,
- ❖ aumento della pressione arteriosa per stimolazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone,
- ❖ tachicardia con palpitazioni,
- ❖ effetti diffusi (alterazioni digestive, confusione, stanchezza, ansia, cute pallida) per inadeguata perfusione tissutale aggravata dal rilascio di catecolamine
- ❖ oliguria, nicturia,
- ❖ tosse inizialmente secca ed insistente che può divenire produttiva con escreato schiumoso con tracce di sangue,
- ❖ edema polmonare.

Insufficienza cardiaca destra:

- ❖ aumento della pressione venosa con distensione delle giugulari,
- ❖ edema declive (piedi, caviglie, sacro) ,
- ❖ epatomegalia con disfunzione epatica secondaria,
- ❖ ascite,
- ❖ anoressia e nausea,
- ❖ astenia,
- ❖ aumento del peso corporeo,
- ❖ nicturia,

Assistenza infermieristica nel postoperatorio in chirurgia generale nelle prime 24-48 ore: elementi di monitoraggio e loro scopo.
Punteggio massimo 7

Scopi

- Rilevare eventuali complicanze
- Trattare il dolore

Elementi di monitoraggio

- Funzione respiratoria: frequenza respiratoria e qualità del respiro, saturazione periferica, colorito cutaneo
- Funzione cardio-vascolare: frequenza cardiaca e ritmo, pressione arteriosa
- Diuresi e bilancio idro-elettrolitico
- Ripresa della minzione
- Temperatura corporea
- Condizioni del sito chirurgico e sistemi di drenaggio (caratteristiche del drenato)
- Stato di coscienza ed orientamento
- Nausea e vomito
- Livello e caratteristiche del dolore
- Postura a tutela della sicurezza e dell'espansione polmonare
- Pervietà accessi venosi



Elencare le fasi del Processo Assistenziale.
Punteggio massimo 7

(Sono considerate corrette entrambe le risposte A e B)

A)	(B)
1.Accertamento <ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dati • Individuazione problemi della persona 	1.Accertamento
2.Pianificazione <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione priorità • Obiettivi • Interventi 	2.Individuazione problemi della persona 3.Pianificazione <ul style="list-style-type: none"> Individuazione priorità Obiettivi Interventi
3.Attuazione	4.Attuazione
4.Valutazione continua e finale	5.Valutazione continua e finale

Le Precauzioni Standard per la riduzione delle infezioni correlate all'assistenza: scopo ed elenco.
Punteggio massimo 6
Scopo

Ridurre il rischio di trasmissione dei microorganismi responsabili delle infezioni correlate all'assistenza. Devono essere adottate su tutti i pazienti indipendentemente dalla diagnosi d'ingresso.

Elenco Precauzioni

- Igiene delle mani
- Impiego sistemi barriera : guanti, mascherine, occhiali, schermi facciali, camice/sovracamice
- Gestione della biancheria
- Gestione strumenti –attrezzature : decontaminazione, disinfezione, sterilizzazione
- Igiene ambientale e smaltimento rifiuti, compresi taglienti

Definisci:
Punteggio massimo 3
Afasia:

L'afasia è la perdita parziale o completa della capacità linguistica, ossia della comprensione e/o dell'espressione linguistica conseguente a un danno alle aree cerebrali del linguaggio e non attribuibile a difficoltà di parola, ossia disturbi dei processi meccanici del linguaggio. Aree e connessioni importanti per il linguaggio sono: area di Broca (produzione del linguaggio), area di Wernicke (comprensione del linguaggio), fascicolo arcuato (fascicolo di fibre il cui ruolo è la connessione tra le aree di Broca e Wernicke) e altre aree parietotemporali e frontali.

Stranguria:

Disturbo della minzione consistente in una dolorosa, difficoltosa e intermittente emissione di urina, spesso a gocce.

Acufene:

Disturbo uditivo costituito da rumori (come fischi, ronzii, fruscii, pulsazioni ecc.) non presenti nell'ambiente esterno che l'orecchio percepisce come fastidiosi a tal punto da influire sulla qualità della vita del soggetto che ne è affetto.



**CONCORSO PUBBLICO PER
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERE – CAT. D**

BIBLIOGRAFIA

- Antonelli - Incalzi R. , *Medicina Interna per scienze infermieristiche*, Piccin Editore 2012
- Brunner-Suddarth, *Infermieristica medico-chirurgica*, CEA 4^a ed. 2010,
- Carpenito L, *Piani di assistenza infermieristica e documentazione*, ed 2° 2011, CEA
- Harrison, *Principi di medicina Interna* 18° ed. CEA
- Nanda International, *Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2015-2017*. CEA
- Saiani, Brugnolli, *Trattato di cure infermieristiche*, 2° edizione. Sorbona 2014
- Treccani Dizionario Medico - sito ultima consultazione 25 maggio 2017
- Wilkinson J.M., *Processo infermieristico e pensiero critico*,CEA 2003

