

Domande orale Milano

Infermieristica

- perchè si compie la paracentesi

la paracentesi viene effettuata per drenare il liquido in eccesso formato nella cavità addominale il pz viene posizionato sul fianco sinistro

.In che posizione metti un paziente per misurazione della pressione venosa centrale è la pressione presente nelle vena cava superiore che riflette la pressione dell'atrio destro, il pz viene posizionato supino bisogna mettere il trasduttore al livello del cuore

- gruppo di controllo in uno studio clinico

è uno studio che viene effettuato su persone sofferenti si cerca di capire le cause, può essere sperimentale ed osservabile

- trial clinico randomizzato (RCT) + vantaggi
- chi effettua l'accertamento di morte cerebrale

il medico legale, neurologo, medico rianimatore (viene effettuata quando non vi è più una risposta del tronco encefalico e il pz viene attaccato a un respiratore.

- apparato urinario

l'apparato urinario è composto da diversi organi reni vescica uretra ureteri serve per produrre ed eliminare l'urina

- errore terapeutico

è un evento non intenzionale ma prevedibile che può recare danno al pz

- studi in singolo, doppio, triplo cieco.

il singolo cieco è lo studio che divide i pz in due gruppi a un gruppo viene dato il farmaco con principio attivo ad l'altro gruppo un farmaco senza principio

- doppio cieco vengono sempre divisi in due gruppi in questo caso però neanche il medico sa chi sta prendendo il principio attivo
- terzo cieco vengono sempre divisi in due gruppi però neanche chi esamina i risultati è a conoscenza di chi assume il principio attivo o il placebo

- segni di bassa portata cardiaca

è quando il cuore non riesce a soddisfare il giusto apporto di ossigeno ai rispettivi organi causando così uno scompenso cardiaco, cronico,

- caratteristiche della febbre

la febbre è un campanello d'allarme è un innalzamento della nostra temperatura corporea per una possibile infezione del nostro organismo -flogosi ecc .può essere intermittente(oscilla molto nelle 24 ore)remittente(può variare di un grado anche nelle 24 ore) costante

- posizionamento delle derivazioni precordiali nell'ECG

è elettrocariogramma che attraverso degli elettrodi a 12 derivazioni 6 periferiche 6 precordiali (v1 4 spazio intercostale destra v2 a sinistra poi va v4 quindi spazio intercostale linea clavicolare di sx V3 TRA v2 e v4- v5 quinto spazio intercostale line ascellare v6 line a ascellare media
periferiche giallo braccio sx verde caviglia sx ecc

- segno di trousseau

è un segno osservabile dato dalle dita e della mani contratte e rigide durante il gonfiore dello sfingo si apprezza in situazioni di ipocalcemia latente (tetania)

- definizione di paresi

è una diminuzione di solito temporaneo di una parte muscolare- mentre la paralisi è una parte del corpo che il pz non riesce più a muovere e a controllare
paresi è una perdita non reversibile di un tratto muscolare puo essere parziale o totale
paralisi è

- paralisi flaccida

la paralisi ossia la perdita del tono muscolare e nervosa è ipotonica

- gestione degli stravasi di farmaci antitumorali

possono causare necrosi infiammazione vescicole rossore o anche niente. bisogna bloccare l'infusione aspirare dall'ago se si riesce 3-4 ml del farmaco rimuovere l'ago mettere del ghiaccio delineare la cute e scrivere la data

- intubazione oro-tracheale

L'intubazione endotracheale è il provvedimento di scelta per il controllo e gestione delle vie aeree in questa categoria si includeranno tutti quei pazienti che hanno un severo grado di ipossia, un alterato grado di coscienza oppure perdita dei riflessi protettivi correlati a patologia ad esempio ictus cerebri

- diarrea nel bambino

perdita di feci liquide è un segno che bisogna contattare subito il pediatra

- definizione di paralisi e differenza da plegia

la paralisi è una perdita completa del movimento e di forza di un tratto muscolare

- utilizzo di farmaci anticoagulanti

i farmaci anticoagulanti servono per rendere fluido il sangue per prevenire coaguli

- ricomposizione della salma

- meningite

la meningite è una infiammazione delle meningi che può causare sintomi meno o molto gravi come le batteriche che portano a morte sintomi febbre alta rigidità nucale cefalea

- urinocoltura nel bambino

dovrebbe essere sterile procedimento lavare accuratamente i genitali del bambino farlo urinare in modo sterile se si riesce

- tempi di digiuno preoperatorio nell'adulto e nel neonato

digiuno adulto 6 ore bambino latte artificiale 6 naturale 4

- cos'è un ustione

è una bruciatura della cute che si suddivide in 4 stadi e a rischio di vita superiore al 40 del corpo

- educazione del paziente portatore di endometriosi

è una malattia benigna del ciclo delle donne che è molto dolorosa anche durante i rapporti

- segni/sintomi di ipoglicemia + interventi al paziente in coma ipoglicemico

i segni sono sudore profuso, nausea, mal di testa confusione, poca attenzione, possibili convulsioni, agitazione, senso di fatica. se il pz è cosciente far assumere zucchero sublinguale se non somministrare glucosio endovena

- fibrosi cistica

è una malattia genetica dovuta ad un'alterazione di un gene colpisce in età pediatrica e adolescenziale è una patologia multiorgano colpendo bronchi e polmoni ma anche il pancreas con difficoltà ad digerire le sostanze

- preanestesia in un paziente con pneumotorace

inanzitutto è la presenza di una bolla o aria nella cavità pleura che rischia di collassare il polmone se non si interviene la sedazione è locale solo nel punto dove verrà inserito il drenaggio

- frizionamento chirurgico delle mani

il frizionamento delle mani è importante x ridurre ed eliminare i germi abbiamo il lavaggio sociale- settico e chirurgico x il frizionamento delle mani con gel alcalino va fatto per 40 secondi almeno

- intervento prioritario in un paziente in arresto cardiocircolatorio

massaggio cardio circolatorio- ed applicare monitor o piastre x vedere la traccia

- precauzioni da attuare in caso di isolamento da contatto

stanza singola o isolamento sono i dpi dispositivi protettivi da contatto (mascherina, visiera, guanti camice occhiali

- pazienti a rischio di TEV/TVP e complicanze

si va contro una chiusura di una vena o di un coagulo che può causare embolia polmonare ictus

- segni/sintomi di shock settico

è una condizione molto grave: tachicardia, ipotensione, ipoperfusione, oliguria, fr alta, febbre, leuopenia, leucocitosi, acidosi respiratoria

- sintomo precoce endometriosi
- segni/sintomi di endometriosi
- raccomandazione ministeriale n°6 sul rischio di caduta

è una situazione frequente negli ospedali o nelle strutture bisogna favorire stanze senza rischi o pericolosi segnalarlo ed ad ogni ricovero eseguire la scheda conley

- scala di exoton-smith

è la scala di rischio di lesioni con diversi punti ossi condizioni stato mentale attività continenza mobilità

- assistenza a paziente con PEG

la peg è una somministrazione enterale che avviene direttamente nello stomaco del pz viene effettuata quando il pz è disfagico o è in uno stato di coma

- sedi di somministrazione di calciparina

in zona ombelicare 4 dita dall'ombellico, braccia cosce

- cannula tracheostomica

è una cannula che permette la respirazione può essere temporanea o permanente

- le alterazioni della diuresi
- oliguria urina sotto i 100- anuria non urina- poliuria urina molto- nicturia urina più volte nella notte- pollachiuria più minzioni con poche quantità- stranguria piccole quantità di urina è dolorosa. disuria minzione difficoltosa

- elenca un esame neurologico

La manovra di Mingazzini (o prova delle braccia protese di Mingazzini) è una manovra semeiologica molto importante per valutare la presenza di alterazioni della motilità degli arti superiori (paresi).

paziente, seduto o in piedi, a occhi chiusi, deve estendere le braccia sul tronco a 90°, con dita ben estese e allargate. – La manovra è NEGATIVA se il paziente riesce a mantenere la posizione per almeno 30 secondi. La manovra è POSITIVA se uno degli arti cade

- utilità del test del sudore

fibrosi cistica. infezioni pancreatiche

- cianosi

colore bluastrò della pelle difficoltà a respirare

- nome degli accessi vascolari
- crioterapia

terapia con uso di ghiaccio scopo sedativo antidolorifico

- cateterismo vescicale estemporaneo + a che tipo di pz si posiziona
- addestramento all'autocaterismo vescicale a pz con lesione lombare

- respiro e tipi di respiro patologici- biot respiri seguiti da una apnea 5-7 secondi- **Cheyne-Stokes seguiti da di 20 secondi ed oltre**

kussmal:respiri profondi e ripetuti

- gestione della maxiemergenza
- urinocoltura in paziente con diuresi spontanea
- perfusione dal punto di vista respiratorio

la perfusione non permette di ossigenare abbastanza il sangue

- ipovolemia

diminuzione di sangue in circolo causata da emorragia interna o esterna

- dove vengono prodotte le cellule emopoietiche
nel midollo osseo nelle ossa piatte

- bradicinesia

è un disturbo neurologico il pz non riesce ad effettuare i movimenti che vuole

- somministrazione per via sublinguale: vantaggi, controindicazioni, 2 farmaci.
carvasin- captopril hanno un assorbimento veloce xchè sulla lingua ci sono i vasi sanguigni
le controindicazioni sono:denti gialli e anche edema

- assistenza al pz. sottoposto a emotrasfusione bisogna controllare la sacca che non ci sia reazione e parametri

- paziente con decadimento cognitivo: interventi per garantire la sicurezza
ambiente confortevole garantire la sicurezza del pz stimolare la memoria

- complicanze della broncoaspirazione

desaturazione,possibili lesioni, piccole emorragie, bradiaritmie ipotensione vaso vagali

- somministrazione di farmaco con erogatore spray
- prevenzione secondaria

diagnosi precoce di una malattia

- functio lesa

infiammazione compromissione delle funzioni

- trasfusioni
- segni/sintomi premonitori del vomito

nausea cute pallida-aumento ritmo cardiaco

- assistenza al pz. nefropatico

tutti i parametri- entrate ed uscite bilancio, valori del sangue

- manovra di Heimlich nell'adulto e nel bambino

- vari tipi di stomie

essa puo essere una situazione transitoria o permanente dipendono dalla sede in cui viene imbocata la stomia

- cateterismo arterioso, che esami si possono svolgere
- ematemesi

fuoriscita di sangue dall'apparato digerente

- percentuale di ossigeno nell'aria

21%

- posizione di trendelemburg

con gli arti alte rispetto la testa

- cause di lipotimia

ipotensione -ipoglicemia stanchezza anemia

- valutazioni prima della somministrazione di furosemide per via orale

pa

- defibrillatore automatico e semiautomatico, carica minima, quando si scarica

- mobilizzazione del paziente emiplegico

- assistenza al paziente con ureterostomia

- gastrolusi

svuotamento gastrico dopo aver ingerito sostanze tossiche o farmaci

- effetti collaterali vaccini

febbre schoch

- scala di Braden

serve per valutare il rischio di pressione in 6 punti (umidità -frizionamento scivolamente

-alimentazione-attività motoria

- classificazione delle lesioni da decubito 4 stadi
- ematocrito: è la percentuale di plasma nel sangue rapportata alle restanti parti ossia corpocellulare gb r piastrino

- manometro di Claude

x la misurazione della pressione dei fluidi durante le punture lombari, in anestesia spinale e per la misura della pressione endocranica (pressione liquorale durante la rachicentesi).

- assistenza al paziente con infarto del miocardio acuto (IMA)
- evento sentinella

è un evento avverso molto grave che può portare a morte o un grave danno

- cosa possono causare compressioni toraciche eseguite in modo errato
- assistenza al paziente con varici esofagee

- medline

è un database bibliografico

- emogasanalisi: descrizione, tipi di campione, valori di riferimento
- triage infermieristico
- educazione al paziente con dialisi peritoneale
- scala di Flacc

la scale del dolore nei bambini e neonati

- vomica

emissione di liquido o solido dall'albero bronchiale

- colica biliare

origina il ipocondrio dx è un dolore molto intenso che può portare a delle complicanze c'è un blocco a livelli della bile per smaltire i grassi

- reazione avversa di un farmaco

è una reazione difficile da prevenire prima che il farmaco venga messo in commercio

- valori fisiologici di emoglobina, patologie legate all'emoglobina bassa, segni/sintomi di anemia

sono oltre i 12 donna 14 uomo. sotto gli otto si procede alla trasfusione

- isolamento stretto

isolamento xche ci può essere un contagio da contatto o vie aeree

- cosa sono i drenaggi
- shock ipovolemico
- test di romberg

un test neuro x vedere se il pz perde l'equilibrio

- gruppi sanguigni

ab/a/b/zero/rh

- indice di Apgar + livello sotto il quale il paziente è critico

è un indice subito dopo il parto con 4 è grave

- ossigenoterapia, quale presidio eroga fino a FiO2 90%

resevoir

- acidosi respiratoria

ph minuisce- co2 aumenta

- drenaggio toracico

viene utilizzato in caso di interventi di pneumotorace

- metodi di trasmissione dell'HIV

con rapporti sessuali sperma sangue liquidi corporei

- chemioterapia: effetti e complicanze

può distruggere le cellule maligne ma può portare ad nausea e vomito lipotimia, anemia.

perdita di capelli.

- formula leucocitaria

leucociti: linfociti- neutrofilii. eosinofili. basofili. macrofagi-

- DPI

dispositivi di protezione individuale

- consenso informato

deve essere chiaro e preciso

- tecnica del flushing e locking (lavaggio CVC)
- effetti dei farmaci vescicanti
- trisma
- esami ematici in caso di pancreatite

lipasi e amilasi

- infezioni correlate alle pratiche assistenziali (IRPA)
- emorragia arteriosa/venosa

- job description
- prevenzione delle infezioni in pz. operato di lobectomia polmonare
- segni/sintomi di flebite
- basi per una corretta alimentazione

- i tipi di ricerca infermieristica

ricerca di base- sperimentale o non sperimentale- longitudinale e trasversale

- cosa valuta la scala ADL

valuta se il pz riesce a soddisfare i suoi bisogni primari quindi indice di indipendenza del pz lavarsi vestirsi mangiare cucinare

- cosa usi per dare una comunicazione formale o informale ai colleghi

- etichetta della tosse
- definizione di infarto

l'infarto è un attacco al cuore che si verifica per una riduzione di sangue al miocardio che può essere per una occlusione delle coronarie o un aritmia

- materiale per enteroclisma evacuativo

- ferita chirurgica: definizione, trattamento e infezioni

è una lesione del tessuto che può essere causata da un trauma involontario o artificiale per un intervento...bisogna mantenerla pulita non bagnarla e disinfettarla

- atelectasia

è il non espasimento o distensione totale del polmone o di parte di esso

- valutazioni in una donna nella fase post-partum

i parametri possibili emorragie anche depressione

- alopecia

è la diminuzione del colore dei capelli e caduta

- preparazione di una soluzione a base di potassio (raccomandazione del MdS)
- come deve comportarsi un paziente con Holter in corso
- cromosomi

formano il dna ogni cellula ha 23 coppie di cromosomi uomo 23 xy donna 23xx

- valutazione neurologica al pz con emiplegia

- ageusia: definizione, segni e sintomi

è la perdita del gusto

- scale di valutazione del dolore in ambito pediatrico

la flacc

- valutazione della disfagia
- gestione della PEG
- posizionamento di un pz. incosciente con polso e respiro spontaneo.

posi laterale di sicurezza

- gestione del CVC
- cartella infermieristica
- Scala di Morse e perchè è sconsigliata in ambito ospedaliero

rischio cadute

- definizione di sepsi.

è una situazione di infezione a livello organico

- Misurazione del livello emodinamico con catetere di Swan-Ganz

- Respiro patologico correlato all'acidosi metabolica

kussmal

- presidi che deve indossare il pz. e operatore in caso di TBC
- Urinocoltura da CV a permanenza
- funzioni della placenta
- dieta del paziente disfagico
- preparazione intestinale pre intervento
- epistassi
- complicanze dell'asportazione di tumore ipofisiario per via transfenoidale
- misurazione del SNG
orecchio naso processo xifoideo
- asepsi

materiali sterilizzati

- scale di valutazione delle lesioni da decubito
- indicazioni per inserimento di catetere vescicale
- definizione e tipi di sterilizzazione
- gestione del PICC dopo aver terminato l'infusione
- febbre remittente

oscilla tra i due tre gradi

- gerontologia

studia i fenomeni e problemi in età senile

- casi in cui si può somministrare un farmaco non preparato personalmente
- anticorpi interessate in una reazione allergica immediata
- definizione di scoliosi
- sintomi dell'ileo paralitico
- pianificazione assistenziale
- nicturia e possibili cause
- mastite
- presidi per la somministrazione EV
- funzione del gruppo di controllo in uno studio clinico
- Concetto di fragilità
- raccomandazione ministeriale per la somministrazione dei farmaci LASA
- ago di Huber
- sintomi della celiachia
- classificazione npuap
- emocoltura, tecnica e raccomandazioni
- indice di massa corporeo (BMI)
- endometriosi
- sito di inserzione di un drenaggio in caso di pneumotorace
- fasi della febbre in paziente pediatrico
- metodo di eliminazione di mezza fiala di uno stupefacente
- definizione di pneumectomia
- biopsia renale
- complicanza a breve termine della disfagia
- spina bifida
- indicazione alla misurazione della PVC

- trattamento del paziente con frattura dell'anca
- materiale occorrente per un'estubazione protetta
- educazione sanitaria
- pz con contenzioni
- caratteristica fondamentale dell'evidence based practise (EBP)
- guarigione di una ferita per seconda intenzione
- cosa provoca il massaggio carotideo
- presidi anti decubito
- scala di conley
- infezioni crociate
- regola delle 7G
- definizione di plasma
- punteggio di silverman
- infezioni nosocomiali
- metodo per l'effettuazione di una coltura da una ferita
- caratteristica principale della valvola di Heimlich
- leucopenia
- tecnica di broncoaspirazione con tracheostomia
- farmaci in capsula (funzione della capsula)
- emottisi: è l'emissione di [sangue](#) dalle [vie respiratorie](#), solitamente attraverso un colpo di [tosse](#).
- definizione di agente patogeno: microrganismo che causa una malattia
- lavaggio delle mani
- lesione da decubito al primo stadio: arrossamento cutaneo che non scompare alla digitopressione
- perchè è importante reinserire il ristagno gastrico
- Il grido idrocefalico: grido improvviso emesso, nello stato di sonnolenza, dal bambino affetto da meningite tubercolare, per il dolore provocato dall'idrocefalia concomitante.
- segni e sintomi da sovradosaggio di farmaci digitalici
- Assistenza infermieristica al pz con ictus (fase acuta)
- elencare almeno due patologie da contatto
- Rilevazione polso tibiale
- Frequenza cardiaca e caratteristiche del polso
- Cos'è il pap test
- Definizione del volume corrente
- assistenza al pz in emodialisi
- parametri vitali da monitorare prima di una trasfusione di emazie concentrate
- valutazione neurologica nel paziente con emiplegia
- Assistenza inf.ca ad un paziente che assume neurolettici
- fast track surgery
- linfedema: si intende una condizione in cui avviene un accumulo anormale di [linfa](#) dovuto ad un'anomalia a livello del [sistema linfatico](#). La sua diffusione avviene soprattutto negli arti.
- Esami ematochimici per la diagnosi di infarto.
- Definizione di Ecmo
- Assistenza al paziente disfagico con compromissione neuromuscolare

- Detersione delle LDP
- Aneurisma e trattamenti
- prevenzione secondaria
- farmaci LASA
- cosa significa il termine neurolettico
- Cosa sono le Linee Guida
- Ipotensione gestione ed educazione pz
- Definizione di 'criterio di esclusione' in una ricerca
- in caso di ittero quale dieta deve seguire il paziente
- Risk management
- Chilotorace
- Definizione di afasia
- medicazione di un accesso venoso periferico (procedura)
- Definizione di rialzo termico
- preanestesia in pz con pneumotorace e tempistica
- I disturbi della minzione
- definizione di pandemia
- Metodo assistenziale in piccola equipe
- cosa si intende per lavaggio sociale delle mani
- Materiali per la BOM
- Principale veicolo di infezioni a livello ospedaliero
- Angiografia
- A cosa serve la fenestrazione nella cannula
- Assistenza alla donna con mastectomia
- Quali sono le indicazioni per il posizionamento del cvc
- Cos'è la coronarografia
- Frequenza cardiaca nel bambino di 2-7 anni
- Ipossia
- Cosa monitori nel pz con lavaggio vescicale
- Aumento della pressione addominale
- In quali casi non si può usare la posizione laterale di sicurezza
- In caso di emergenza, quale catetere non può essere utilizzato per la somministrazione dei farmaci
- Emotorace
- Definizione "problem solving"
- Cos'è la PVC
- Cos'è il pneumotorace
- PICC: definizione
- assistenza a pz in emodialisi
- PONV (post operatory nausea and vomit)
- parametri da valutare prima di trasfondere emazie
- valutazione neurologica nel pz con emiplegia
- assistenza a pz che assume neurolettici
- assistenza a pz che assume anticolinergici
- fast track surgery
- linfedema

- esami ematochimici per diagnosi infarto
- ECMO
- assistenza a pz disfagico con compromissione neuromuscolare
- detersione lesioni da pressione/decubito
- aneurisma e trattamenti
- farmaci LASA
- cosa significa termine neurolettico
- cosa sono le linee guida
- ipotensione (gestione ed educazione pz)
- definizione di criterio di esclusione
- paralisi spastic e flaccida
- in caso di ittero che dieta segue il pz
- chilotorace
- afasia
- procedura disinfezione di CVC e CVP
- definizione di rialzo termico
- angiografia
- a cosa serve la fenestrazione della cannula
- assistenza alla donna post mastectomia
- cosa sono i vaccini e complicanze
- perche posizione CVC
- coronarografia
- FC bambino(2-7 anni)
- ipossia
- cosa monitori nel pz portatore di lavaggio vescicale
- aumento pressione addominale
- in quali casi non si puo usare la posizione laterale di sicurezza?
- in caso di emergenza quale catetere non si puo usare per somministrare farmaci?
- emotorace
- problem solving
- pneumotorace
- interventi nel preoperatorio e post per prevenire TVP

Informatica

- desktop
- Powerpoint
- Blog
- formattazione
- compressione di un file
- database
- cochrane
- formato delle immagini
- link
- software
- email
- spam
- modem
- chiavetta USB
- esempio di sistema operativo
- backup
- Alt+F4
- notebook
- intranet
- scheda madre
- hard disk
- internet
- password
- link
- file .zip
- download
- interfaccia utente
- server stmp
- megabyte
- firewall
- hacker
- file
- firma digitale
- combinazione di ctrl+c ctrl+v
- spamming
- sistema operativo
- server
- B"@"
- hashtag
- sistema operativo multitasking
- software
- plotter
- hardware
- social network
- tastiera qwerty
- formato file non modificabile
- link
- come eseguire una ricerca bibliografica
- sito internet
- pixel
- metodo di ricerca di asbtract
- database
- power point
- pubmed
- operatori booleani
- utilità di word
- login
- siti web
- Mega hertz
- browser
- cosa significa navigare
- windows
- Cd-rom
- cosa significa "cliccare"
- posta indesiderata
- definizione on line"